

ମାଣ୍ଡିଆରେ ମହିଷା ରୋଗ (Blast)



ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କବକ ବା ଫିଙ୍ଗିର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ । ଏହି ରୋଗ ତାଳି କିଆରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ପାତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇପାରେ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ବା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ସେହି ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ବଢ଼ି ଲାମ୍ବାକୃତି କିମ୍ବା ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ । ଦାଗର ମଝିଅଂଶ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତାର ଚାରିପାଖ ବାଦାମିରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ । ତାଳି କିଆରୀରେ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ତାଳି ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଆ ହେବା ପରେ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପତ୍ରରେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ଗଣି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ କେଣ୍ଡା ବା ଖେଡ଼ କଳା ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

- ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ , ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗିର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।
- ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ମାତ୍ରା କମ କରନ୍ତୁ ।
- ଜମିରୁ ଅନାବନା ଘାସ ବାହୁଡ଼ି ।
- ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଶୀଘ୍ର ରୋପା କରନ୍ତୁ ।
- ୨୫୦ ଗ୍ରାମର ବେଲ ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରସକୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ବୀଜାମୃତ (୨୦୦ ମି.ଲି./୧ କେ.ଜି) କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇକୋଡ଼ର୍ମା ପାଇଡ଼ର (୧୦ଗ୍ରାମ/୧କେ.ଜି)ରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ୧ ଲିଟର ଗୋମୁତ୍ରରେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଥରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡିଜିମି କିମ୍ବା ୮ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ

